

### III.—ZOOLOGIA

#### 3.—UN BRAQUIURO NUEVO CHILENO (*Eurypodius quiriquinensis* n. sp.)

PARMENIO Y AÑEZ A.

A fines del verano de este año recibí del Dr. Reed, conocido naturalista de Valparaíso, tres ejemplares de una especie de pequeños braquiuros que habían sido recogidos por él, de una red de arrastre, en la Isla Quiriquina.

Estos braquiuros son conocidos por los pescadores con el nombre de arañas de mar, y los ejemplares enviados, para su determinación, pertenecen a la tribu **OXYRHYNCHA**, familia **MAJIDAE** y sub-familia **Inachinae**.

Por su aspecto general, y sobre todo, por el rostro, coinciden con el género *Oregonia* Dana, 1851, propio del Mar de Behring y de las costas norteamericanas del Pacífico; pero un estudio más atento del caparazón y de las extremidades permitió colocarlo en el género *Eurypodius* Guerin, 1825, de la extremidad austral de Sud América, y representado, según Rathbun (1), en los mares chilenos por sus dos únicas especies:

*E. latreilli* Guerin, 1828

*E. longirostris* Miers, 1886

La primera, bastante grande (caparazón de hasta 7 cm. de largo), y de color gris verdoso, se encuentra a profundidades menores de 80 brazas en ambas costas sud-americanas; desde la latitud de Río de Janeiro al sur. La otra se conoce sólo por su tipo, capturado por los naturalistas del «Challenger», en las costas de la Patagonia chilena (Canal Ancho), a 175 brazas.

La especie de nuestra referencia, pequeña (el caparazón del ejemplar mayor mide, excluido el rostro, 25 mm. de largo), de color ocre rojizo (N.º 198 del Code de Séguy) (2), y capturada a menos de 20 brazas, no coincide con ninguna de las dos especies aceptadas. Se caracteriza por su caparazón estrecho y triangular, incluyendo el rostro, y por sus cuernos rostrales contiguos, largos, paralelos, horizontales y progresivamente adelgazados hacia la extremidad distal. Su longitud está contenida poco más de dos veces en el largo de la porción post-frontal del caparazón (el rostro de *E. Latreilli*, está contenido algo más de cuatro veces).

Denominamos a esta especie *E. quiriquinensis*; su tipo que, por ahora, se conserva en la Estación de Biología Marina de Montemar, será depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, cuando, ulteriormente, se haga una descripción completa de ella.

### Clave del género *Eurypodius*

A 1.—Rostro más corto que un tercio del caparazón.

*E. latreilli*

A 2.—Rostro más largo que un tercio del caparazón.

B 1.—Levantado oblicuamente

*E. longirostris*

B 2.—Horizontal

*E. quiriquinensis*

□ □ □

1) Rathbun, Mary, J. The spider crabs of America. U. S. Nat. Mus. Bull. 129, pág. 80. Washington 1925.

2) Séguy, E. Code universel des couleurs. Paris, 1938.